

ALLEGATO A

Criteria per definizione risposta clinica completa (cCR) e risposta clinica quasi completa (nCR)

	RISPOSTA CLINICA COMPLETA (cCR)	RISPOSTA CLINICA QUASI COMPLETA (nCR)*
Endoscopia (rettoscopia)	Cicatrice biancastra piatta Teleangectasie Assenza di ulcerazioni Assenza di masse o noduli	Minime irregolarità della mucosa o nodularità <3cm Ulcerazione superficiale <3cm
EDAR (esplorazione digitale ano-rettale)	Nella norma (non masse palpabili)	Area indurata liscia o minime anomalie della mucosa
RM – T2W	Presenza unicamente di segnale scuro in T2 E Assenza di linfonodi visibili (≥ 5 mm lungo asse corto)	Presenza di segnale in prevalenza scuro o residuo segnale intermedio in T2 E/O Persistenza di max 1fn sospetto nel mesoretto
RM – DWI	Assenza di tumore visibile con segnale B800-B1000 E/O Mancanza di segnale o segnale di bassa intensità con ADC map	Significativa regressione di segnale in B800-B1000 E/O Segnale minimo o di bassa intensità residua con ADC map

*vedi allegato B per la subclassificazione della nCR

N.B. Tutti i casi che presentino ulcere con bordi rilevati >3cm, masserelle tumorali residue >3cm, presenza di malattia estensiva murale o malattia extramurale in RM, persistenza di linfonodi sospetti >1 mesorettali o >=1 extramesorettali sono da definirsi **risposte incomplete (iCR)**