




GESTIONE DELLE LESIONI PENIENE

Gruppo di Studio Tumori del Pene e del testicolo

Coordinatori: Falcone Marco, Girelli Giuseppe, Miraglia Stefania, Sedigh Omidreza

Documento approvato dal Gruppo di Studio

Calleris Giorgio, Dal Canton Orietta, De Bellis Matteo, Depetris Ilaria, Niculescu
Ravzan Gabriel, Pezzuto Valter, Zitella Andrea



Salve dottore, ho un fastidio al pene.

Salve dottore, ho un bruciore al pene.

Salve dottore, mi è comparsa una macchia sul pene.

Sintomi irritative locali o comparsa di lesioni macroscopiche



Presenza di una lesione peniena



Esame obiettivo di glande, prepuzio (foglietto interno ed esterno) e asta peniena

Lesione peniena

Piatta e arrossata

Esofittica e/o ulcerata

Tattamento topico per 7 giorni con crema a base di cortisonico a basso dosaggio.
Es: Clobetasolo

Tattamento orale per 5 giorni con antibiotico (Cefalosporina di III gen o Amoxicillina)

Ripetere EO:
A. Risoluzione del quadro clinico → stop
B. **Persistenza della lesione**

Ripetere EO:
A. Risoluzione del quadro clinico → stop
B. **Persistenza della lesione**

Inviare il paziente in un centro di riferimento per valutare indicazione a biopsia peniena

