

ACALABRUTINIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo ACALABRUTINIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di tumori del sangue: leucemia linfocitica cronica e linfoma a cellule mantellari.

- compresse da 100 mg

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di ACALABRUTINIB è di 100 mg 2 volte al giorno.

Prima di iniziare il trattamento, periodicamente nel corso del trattamento e come clinicamente indicato, devono essere eseguiti emocromo completo e test di funzionalità epatica.

DOVE LO RITIRO?

Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale
presso cui è seguito/a.


COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?

Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. E' importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista. Le compresse di Acalabrutinib devono essere deglutite intere, con un bicchiere d'acqua, una volta ogni 12 ore circa, con o senza cibo, e non devono essere rotte o frantumate.

Se si è dimenticato o vomitato una dose: entro 3 ore dall'orario, assuma la dose normale prevista; dopo 3 ore dall'orario, assuma solo la dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare le compresse dimenticate

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo non oltre la **data di scadenza**.



Inferiore
a 30°C



A TEMPERATURA
AMBIENTE

FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali e integratori, contatti il Suo medico o il suo farmacista.



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento che Le è stato prescritto potrebbe provocarle dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona, segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come gravi comuni e molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- sanguinamento
- infezioni
- battito cardiaco accelerato o battiti cardiaci saltati, polso debole, capogiri
- febbre, brividi, nausea, vomito

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Il farmaco che sta assumendo può provocare sonnolenza e dare capogiri, è sconsigliato guidare o usare strumenti o macchinari. Questo farmaco non richiede particolari condizioni di conservazione

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA:

<https://medicinali.aifa.gov.it>

Banca dati EMA:

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>