

ABEMACICLIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo ABEMACICLIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di alcuni tipi di cancro della mammella femminile.

- compresse da 150 mg
- compresse da 100 mg
- compresse da 50 mg

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di Abemaciclib è di 150 mg due volte al giorno per 28 giorni consecutivi. Il farmaco verrà prescritto in associazione ad un inibitore dell'aromatasi o tamoxifene(terapia adiuvante) oppure in associazione ad un inibitore dell'aromatasi o fulvestrant (malattia avanzata). Eventuali riduzioni della dose saranno valutate dallo specialista.

DOVE LO RITIRO?

Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale presso cui è seguito/a.

COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?


Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. E' importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista.

Le compresse di Abemaciclib devono essere deglutite intere, con un bicchiere d'acqua, due volte al giorno all'incirca alla stessa ora tutti i giorni, preferibilmente al mattino e alla sera, per avere sempre una sufficiente quantità di medicinale nel suo organismo.

In caso di vomito dopo aver preso la dose o se dimentica una dose, assuma la dose successiva al solito orario. Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata o vomitata.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo non oltre la **data di scadenza**.



Inferiore a
30°C



A TEMPERATURA
AMBIENTE

FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali e integratori, contatti il Suo medico o il suo farmacista.

Si consiglia di evitare l'assunzione di:

- pompelmo e succo di pompelmo
- Erba di San Giovanni



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento che Le è stato prescritto potrebbe provocarLe dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona. Segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- diarrea (al primo segno di diarrea, inizi il trattamento con agenti antidiarroici, come Loperamide)
- infezioni
- coagulopatie
- nausea, vomito, stomatite
- stanchezza, debolezza, diminuzione dell'appetito,
- mal di testa, capogiro
- alterazione di alcuni parametri ematici,
- ecc.

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Conservare il farmaco nel contenitore originale per proteggerlo dall'umidità.

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA: <https://medicinali.aifa.gov.it/>

Banca dati EMA:
<https://www.ema.europa.eu/>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza
<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>