

MOMELOTINIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo MOMELOTINIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti ADULTI con anemia da moderata a severa che sono affetti da mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi

- compresse da 100 mg
- compresse da 10 mg
- compresse da 200 mg

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di momelotinib è di 200 mg una volta al giorno. Eventuali riduzioni della dose saranno valutate dallo specialista.

DOVE LO RITIRO?


Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale presso cui è seguito/a.

COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?

Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. È importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista. Le compresse di momelotinib devono essere ingerite intere, possono essere assunte ai pasti o lontano dagli stessi. Se dimentica di assumere le compresse, prenda la dose successiva all'orario abituale.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo non oltre la **data di scadenza**.



A TEMPERATURA
AMBIENTE



FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali e integratori contatti il Suo medico o il suo farmacista.

Si consiglia di evitare l'assunzione di:



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento che Le è stato prescritto potrebbe provocarLe dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona. Segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- disturbi gastrointestinali (nausea, diarrea e dolore addominale)
- capogiro, cefalea
- trombocitopenia
- astenia, affaticamento

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Conservare il farmaco nel contenitore originale per proteggerlo dall'umidità. Non rimuovere l'essiccante.

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA: <https://medicinali.aifa.gov.it/>

Banca dati EMA: <https://www.ema.europa.eu/en/homepage>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>