

NIRAPARIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo NIRAPARIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento del carcinoma ovarico epiteliale avanzato, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario.

Compresse da 100 mg .

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di Niraparib è 300 mg (tre compresse da 100 mg) da assumere una volta al giorno. E' possibile la riduzione della dose a 200 mg e 100 mg al giorno. Eventuali riduzioni della dose saranno valutate dallo specialista.

DOVE LO RITIRO?

Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale presso
cui è seguito/a.

COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?


Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. È importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista.

Le compresse di Niraparib devono essere inghiottite intere e non devono essere masticate, schiacciate, disciolte o divise. Le compresse di Niraparib vanno assunte lontano dai pasti (almeno 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto) o insieme ad un pasto leggero.

Se viene dimenticata una dose di Niraparib , questa deve essere assunta a meno che non manchino meno di 6 ore alla dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo non oltre la **data di scadenza**.



A TEMPERATURA
AMBIENTE



FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali, integratori e alimenti, contatti il Suo medico o il suo farmacista.

Si consiglia di evitare l'assunzione di:

- Arancio amaro
- Erba di San Giovanni
- Pompelmo



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento potrebbe provarLe dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona. Segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- neutropenia, leucopenia, anemia
- nausea,
- stanchezza/astenia
- anemia
- vomito
- diarrea

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Conservare il farmaco nel contenitore originale per proteggerlo dall'umidità.

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA:

<https://medicinali.aifa.gov.it>

Banca dati EMA:

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>