

PALBOCICLIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo PALBOCICLIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di alcuni tipi di cancro della mammella maschile e femminile.

- compresse da 125 mg
- compresse da 100 mg
- compresse da 75 mg

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di Palbociclib è di 125 mg una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di sospensione. Il farmaco verrà prescritto in associazione ad un inibitore dell'aromatasi o fulvestrant. Eventuali riduzioni della dose saranno valutate dallo specialista.

DOVE LO RITIRO?

Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale presso cui è seguito/a.

COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?


Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. E' importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista.

Le compresse di Palbociclib devono essere deglutite intere, con un bicchiere d'acqua, una volta al giorno circa alla stessa ora con o senza cibo, e non devono essere rotte o frantumate.

Se si è dimenticato o vomitato una dose, assuma la dose normale prevista il giorno successivo. Non prenda una dose doppia per compensare le compresse dimenticate.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo non oltre la **data di scadenza**.



Inferiore a
30°C

A TEMPERATURA
AMBIENTE



FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali e integratori, contatti il Suo medico o il suo farmacista.

Si consiglia di evitare l'assunzione di:

- pompelmo e succo di pompelmo
- Erba di San Giovanni



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento che Le è stato prescritto potrebbe provocarLe dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona. Segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- infezioni
- cute secca, eruzioni cutanee, stomatite
- stanchezza, debolezza, diminuzione dell'appetito
- alterazione di alcuni parametri ematici,
- ecc.

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Conservare il farmaco nel contenitore originale per proteggerlo dall'umidità.

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA: <https://medicinali.aifa.gov.it/>

Banca dati EMA: <https://www.ema.europa.eu/>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza
<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>