

RIBOCICLIB

CONTATTI

Consulta l'elenco dei
Centri Accoglienza e Servizi
sul sito www.reteoncologica.it



Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono parte del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Principio attivo RIBOCICLIB

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il trattamento di alcuni tipi di cancro della mammella femminile.

- compresse da 200 mg

QUAL E' LO SCHEMA DI TRATTAMENTO?

La dose raccomandata di Ribociclib è di 600 mg (3 compresse) una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di sospensione. Il farmaco verrà prescritto in associazione ad un inibitore dell'aromatasi o fulvestrant. Eventuali riduzioni della dose saranno valutate dallo specialista.

DOVE LO RITIRO?

Ritiri il medicinale presso la
Farmacia/ambulatorio dell'Ospedale presso cui è seguito/a.

COME LO ASSUMO? E SE DIMENTICO UNA COMPRESSA?


Ricordi che l'effetto della terapia dipende anche dalla regolarità dell'assunzione. E' importante che Lei assuma la terapia seguendo le indicazioni dello specialista.

Le compresse di Ribociclib devono essere deglutite intere, con un bicchiere d'acqua, una volta al giorno circa alla stessa ora con o senza cibo, e non devono essere rotte o frantumate.

Se si è dimenticato o vomitato una dose, assuma la dose normale prevista il giorno successivo. Non prenda una dose doppia per compensare le compresse dimenticate.

COME LO CONSERVO?

Il medicinale deve essere conservato nella **confezione originale**, insieme al foglietto illustrativo, fuori frigo per **due mesi dalla data di consegna** (in frigorifero fino a scadenza)



Inferiore a
25°C

A TEMPERATURA
AMBIENTE



FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

COME MI COMPORTO SE DEVO ASSUMERE NUOVI FARMACI O INTEGRATORI?

Comunichi alla sua equipe di cura se è in trattamento per patologie croniche e quali farmaci assume.

Prima di assumere nuovi medicinali ed integratori contatti il Suo medico o il suo farmacista.

Si consiglia di evitare l'assunzione di:

-pompelmo e succo di pompelmo

-Erba di San Giovanni

Non assuma ribociclib se allergica alle arachidi o alla soia.



Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

...E SE COMPAIONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

Il trattamento che Le è stato prescritto potrebbe provocarLe dei **disturbi**.

Tali segni e sintomi possono comparire in qualunque momento, a volte sono solo ritardati.

Comparsa e intensità degli effetti collaterali dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona. Segua le indicazioni che le sono state fornite o contatti la sua equipe di cura.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI PIU' FREQUENTI ?

Gli effetti collaterali classificati come molto comuni per il farmaco che sta assumendo sono:

- infezioni
- cute secca, eruzioni cutanee, stomatite
- stanchezza, debolezza, diminuzione dell'appetito
- alterazione di alcuni parametri ematici, -ecc.

Per ulteriori informazioni consulti il foglietto illustrativo che le è stato fornito con il farmaco.

AVVERTENZE SPECIALI

Conservare il farmaco nel contenitore originale per proteggerlo dall'umidità. Il farmaco può essere conservato fuori frigo 2 mesi dalla data di consegna. Trascorsi i due mesi di conservazione fuori frigo il farmaco non è più utilizzabile.

INFORMAZIONI PER OPERATORI SANITARI

Banca dati AIFA: <https://medicinali.aifa.gov.it/>

Banca dati EMA: <https://www.ema.europa.eu/>

Si raccomanda di segnalare le reazioni avverse attraverso il portale AIFA di Farmacovigilanza
<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>