

ASL BIELLA

Titolo:	Neoaspmet Neoadjuvant Aspirin and/or Metformin during preoperative induction chemotherapy and chemoradiotherapy for locally-advanced rectal cancer. A multi-arm, multi-stage, intergroup (STAR-04/SICO-CR01/GISCAD/AIRO-GI) randomised clinical trial. The NeoAspMet trial
Patologia:	Cancro del retto
Tipo di Studio:	Sperimentale
Fase:	2/3
Principali criteri di inclusione:	-Diagnosi istopatologica di adenocarcinoma del retto, attraverso una biopsia endoscopica, entro 56 giorni prima della randomizzazione. -Cancro del retto localmente avanzato (definito tramite la classificazione TNM come Stadio II o III), sulla base del seguente workup diagnostico minimo: MRI della pelvi, CT torace-addome con mezzo di contrasto. -Non vi siano controindicazioni alla chemioterapia di induzione, radiochemioterapia ed escissione totale del mesoretto (TME).
Principali criteri di esclusione	-Pregresso trattamento per LARC (i tumori recidivi del retto sono esclusi) o pregressa radioterapia della pelvi. -Evidenza inequivocabile di malattia metastatica al workup diagnostico minimo. Pazienti con lesioni equivocabili sono eleggibili. -Pazienti già sotto terapia quotidiana con aspirina e/o metformina da più di 4 settimane prima della randomizzazione. -Ipersensibilità ai composti a base di acido salicilico o inibitori delle sintesi delle prostaglandine o di qualunque altro eccipiente. -Ipersensibilità alla metformina o a qualunque altro eccipiente.
Sede e contatti	ASL BI- Clinical Trial Center (01515156510 ufficio.sperimentazioni@aslbi.piemonte.it)