

Titolo:	Colorectal metastasis and liver transplantation with organs from deceased donors: an inductive Padova center protocol (ME.L.O.D.I.C)
Patologia:	Metastasi Epatiche da Tumori del Colon Retto
Tipo di Studio:	Prospettico Multicentrico Non Randomizzato Sperimentale
Fase:	II
Principali criteri di inclusione:	- ≥ 18 e < 70 anni di età -Buon Performance Status, (ECOG 0 o 1) -BRAF wild-type -Adenocarcinoma del colon o del retto documentato istologicamente -Resezione chirurgica del tumore primitivo a elevato standard oncologico, definita da: margine di resezione libero da malattia, resezione curativa del tumore primitivo incluso un margine di resezione circonferenziale di almeno 2 mm per tumore rettale -Ricorrenza di metastasi dopo seconda resezione epatica o metastasi non resecabili in maniera curativa -Almeno una linea di trattamento (3 mesi) di chemioterapia sistemica -Metastasi epatiche coloretali confermate come non resecabili da Gruppo Multidisciplinare Oncologico Coloretale -Assenza di localizzazioni extraepatiche di neoplasia o ricorrenza locale secondo valutazione con TAC, RM e PET-TAC (entro 4 settimane prima del meeting multidisciplinare di inclusione) -Prima dell'inizio della chemioterapia nessuna lesione dovrà essere > 10 cm -Risposta RECIST 1.1 o Stable Disease a 2 stadiazioni TC consecutive, in assenza di aumento del CEA -Per pazienti con risposta $< 10\%$ alla chemioterapia questi potranno essere inclusi se otterranno almeno il 20% di risposta

	con TACE (DEB-IRI) o ^{90}Y-sfere -Intervallo di almeno 10 mesi tra la resezione del CRC e la data d'immissione in lista per trapianto -CEA < 100 ng/mL
Principali criteri di esclusione:	BMI > 30 Perdita di peso > 10% negli ultimi 6 mesi Rifiuto alla partecipazione Controindicazioni generiche al LT (ad esempio malattia cardio-polmonare severa, o altre coesistenti condizioni mediche life-limiting, neoplasie extraepatiche, abuso attivo di alcol o sostanze, infezioni attive o sepsi non controllata, mancanza di supporto psicosociale o mancanza di compliance alla terapia medica) Altre neoplasie maligne concomitanti oppure entro i 5 anni precedenti al LT (secondo valutazione trapiantologica multidisciplinare) Pazienti che non hanno ricevuto un trattamento standard per il tumore colo-rettale primitivo Pregressa malattia epatica metastatica o recidiva locale Gravidanza o allattamento
Sede e contatti	AOU Città della Salute e della Scienza di Torino S.C. Chirurgia Generale 2U Centro Trapianto di Fegato Direttore: Prof. R.Romagnoli