

Protocolli di Ricerca Clinica in ambito oncologico

Titolo:	SIBLINGS TRIAL - A phase II study of Sonidegib in Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (Gorlin) syndrome and sporadic BCC patients in EADO stage IIb
Patologia:	popolazione NBCCS (Sindrome di Gorlin) / pazienti BCC sporadici
Tipo di Studio:	Interventistico multicentrico
Fase:	II
Principali criteri di inclusione:	• Una delle seguenti condizioni: - Soggetto con diagnosi accertata di NBCCS - Soggetto con BCC comune\sporadico • Stadio clinico IIB secondo la classificazione EADO [Numero molto elevato di BCC comune (>10) o BCC complesso multiplo (>5) nel setting di casi apparentemente sporadici o nella sindrome di Gorlin. • Valutato come difficile da trattare: non trattabile con chirurgia o RT e quindi idoneo per la terapia HHI (inibitori di Hedgehog)
Principali criteri di esclusione:	• Malattia metastatica (M1), viscerale e/o linfonodale • Precedente terapia HHI negli ultimi 2 anni • Ha ricevuto un precedente trattamento sistemico per BCC; sono consentite terapie locali
Sede e contatti	AOU Città della Salute e della Scienza di Torino- SC Dermatologia U Via Cherasco 23, 10126 Torino Prof. Pietro Quaglino Dr. Paolo Fava 0116335858