



## ASL BIELLA

Titolo:	Malt ielsg 38 Studio di fase II di combinazione di Clorambucile con Rituximab sottocutaneo seguito da terapia di mantenimento con Rituximab sottocutaneo in pazienti affetti da linfoma marginale a cellule B extranodale del tessuto linfatico associato alle mucose (Linfoma tipo MALT)
Patologia:	Linfoma
Tipo di Studio:	Sperimentale
Fase:	2
Principali criteri di inclusione:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnosi istologica di linfoma non Hodgkin marginale tipo MALT CD20 positivo di nuova diagnosi, oppure in recidiva dopo terapia locale (chirurgia, radioterapia oppure antibiotico terapia per i pazienti con linfoma gastrico Helicobacter Pylori positivo) originato in qualsiasi sede extranodale.</li> <li>2. Malattia misurabile o valutabile</li> <li>3. Tutti gli stadi secondo Ann Arbor (I-IV)</li> </ol>
Principali criteri di esclusione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evidenza istologica di trasformazione in un linfoma ad alto grado</li> <li>2. Precedente chemioterapia</li> <li>3. Radioterapia nelle ultime 6 settimane prima della inclusione nello studio</li> <li>4. Precedente immunoterapia con anticorpi monoclonali anti-CD20</li> <li>5. Infezione da HIV, epatite B attiva, epatite C</li> </ol>
Sede e contatti	ASL BI- Clinical Trial Center (01515156510 ufficio.sperimentazioni@aslbi.piemonte.it)