

Titolo:	ATEZOTRIBE2 - STUDIO DI FASE III RANDOMIZZATO DI PRIMA LINEA DI TRATTAMENTO CON FOLFOXIRI PIU' BEVACIZUMAB E ATEZOLIZUMAB VERSO FOLFOXIRI PIU' BEVACIZUMAB IN PAZIENTI CON TUMORE DEL COLON RETTO METASTATICO NON RESECABILE PMMR E IMMUNOSCORE IC-HIGH
Patologia:	gastroenterico
Tipo di Studio:	Interventistico farmacologico
Fase:	3
Principali criteri di inclusione:	• Diagnosi istologicamente accertata di adenocarcinoma del colon-retto • Carcinoma del colon retto metastatico non resecabile non precedentemente trattato con chemioterapia nel setting metastatico • Status "proficient" del sistema del mismatch repair (pMMR) su tessuto tumorale (primitivo o metastasi), determinato localmente con test certificato EU-IVDR • Status Immunscore IC-High su tessuto tumorale (primitivo o metastasi), determinato centralmente (HEGP, AP-HP, INSERM, France)
Principali criteri di esclusione:	• Radioterapia su qualsiasi sede entro le quattro settimane precedenti l'inizio dello studio • Precedente chemioterapia adiuvante contenente oxaliplatino • Precedente trattamento con bevacizumab • Precedente trattamento con anticorpi CD137 agonisti, anti-CTLA4, anti-PD-1, o anti-PD-L1 o con agenti che interagiscono con queste vie di segnale • Deficit completo della diidropirimidina de-idrogenasi (DPYD)
Sede e contatti	AO S. Croce e Carle ctc@ospedale.cuneo.it 0171641539