



A.O. S. Croce e Carle di Cuneo

Titolo:	Studio di fase III in pazienti con tumore del colon-retto metastatico, RAS/BRAF wild type sul tessuto tumorale e RAS mutato su biopsia liquida con l'obiettivo di confrontare una terapia di prima linea con schema FOLFIRI in associazione a cetuximab o bevacizumab
Patologia:	gastroenterico
Tipo di Studio:	Interventistico farmacologico
Fase:	3
Principali criteri di inclusione:	Diagnosi di tumore del colon-retto confermata istologicamente RAS/BRAF wild-type (metastasi primaria e/o correlata). Tumore del colon-retto metastatico non candidabile alla chirurgia e non trattato in precedenza con chemioterapia per malattia metastatica. Pazienti candidabili a una chemioterapia di prima linea.
Principali criteri di esclusione:	Precedenti chemioterapie, ad eccezione di un trattamento adiuvante completato almeno 6 mesi prima rispetto alla randomizzazione. Qualsiasi controindicazione all'uso di Cetuximab, Bevacizumab, Irinotecan, 5FU o acido folinico Radioterapia in qualsiasi sede entro 4 settimane prima della randomizzazione.
Sede e contatti	AO S. Croce e Carle ctc@ospedale.cuneo.it 0171641539