

Titolo:	Apalutamide e radioterapia stereotassica in pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico a basso carico ormonosensibile – PERSIAN
Patologia:	Carcinoma prostatico metastatico a basso carico ormonosensibile
Tipo di Studio:	Studio prospettico randomizzato, in aperto, che include prelievi ematici.
Fase:	II
Principali criteri di inclusione:	• Pazienti che hanno firmato il Consenso Informato • Pazienti adulti ≥ 18 anni • Pazienti oligometastatici ormonosensibili, definiti dalla presenza di ≤ 5 lesioni metastatiche non viscerali • Tutte le lesioni devono essere trattabili con radioterapia stereotassica a giudizio del radioterapista • I pazienti con recidiva metastatica dopo precedente radioterapia definitiva o prostatectomia radicale saranno inclusi nello studio, premesso che un approccio radicale sulla prostata sia stato effettuato • La terapia di deprivazione androgenica deve essere stata iniziata ≤ 6 mesi prima dell'arruolamento • I pazienti devono essere eleggibili per il trattamento con Apalutamide
Principali criteri di esclusione:	• Presenza di malattia viscerale • Malattia metastatica ab initio • Qualsiasi controindicazione all'utilizzo di Apalutamide • Qualsiasi condizione per la quale, nell'opinione del medico curante, la radioterapia stereotassica non dovrebbe essere proposta o potrebbe essere controindicata.
Sede e contatti	Per il Promotore: Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus lorenzo.livi@unifi.it Per il Centro clinico partecipante: SC ONCOLOGIA – Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Strada Tanaro 7 – 12060 Verduno (CN), ricerca@aslcn2.it