AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – PO Molinette

Titolo:	Real-World Outcomes of DArolutamide, ADT, with or without Docetaxel in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. ROAD study
Patologia:	carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile
Tipo di Studio:	osservazionale farmacologico prospettico
Fase:	
Principali criteri di inclusione:	Soggetti adulti (≥18 anni) con diagnosi di carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile. Possibile inizio di terapia di deprivazione androgenica (ADT) fino a 120 giorni prima dell'arruolamento. Decisione clinica di iniziare trattamento con darolutamide ± docetaxel già presa secondo la pratica clinica abituale prima dell'inclusione nello studio. Aspettativa di vita ≥3 mesi
Principali criteri di esclusione:	Partecipazione ad altri studi sperimentali con interventi non appartenenti alla normale pratica clinica. Controindicazioni al trattamento secondo l'autorizzazione locale di darolutamide. Precedente trattamento per carcinoma prostatico con: inibitori AR di seconda generazione (es. enzalutamide, apalutamide o altri sperimentali); inibitori CYP17 (es. abiraterone o altri sperimentali). Precedente terapia ormonale nel contesto metastatico. Inizio del trattamento con darolutamide >7 giorni prima dell'arruolamento.
Sede e contatti	AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – PO MOLINETTE, Oncologia Medica 1U – UFFICIO TRIALS (tel. 0116334252, indirizzo e-mail: trialsmolinette@gmail.com)